

PROTOCOLLI D'USO PER IL TRATTAMENTO DEL DEFICIT ERETTILE

Il Comitato Scientifico di Sanedia ha predisposto un Protocollo Terapeutico per il trattamento, nella pratica ambulatoriale, di soggetti con problemi di deficit erettile di lieve, media e elevata entità

1. Protocollo per pazienti che presentano deficit erettile di lieve e media entità

Il paziente segnala di essere soggetta in maniera frequente ad un insufficiente erezione in termini di durata e turgidità del membro, il paziente inoltre lamenta un calo del desiderio sessuale. Il problema è di lieve o media entità.

Il trattamento preventivo per ridurre od eliminare tale deficit prestazionale prevede:

- 1) L'assunzione di una (1) bustina al giorno di Andros Sanedia, sciolta in un bicchiere d'acqua e preferibilmente assunta al mattino dopo colazione.
- 2) Gli effetti del trattamento iniziano ad essere riscontrabili in maniera significativi dopo 10-15 gg di trattamento e raggiungono il loro effetto massimo nell'arco di 2-3 mesi

Andros di Sanedia grazie al contenuto di Citrulina, Arginina e Tribulus migliorano l'erezione, il cacao, la maca hanno effetti afrodisiaci e di aumento del desiderio ed unitamente alla carnitina e al co-enzima Q10 aumentano tono ed energia.

2. Protocollo per pazienti che presentano deficit erettile di media-elevata intensità.

Il paziente segnala di essere soggetta in modo pressoché continuativo ad un insufficiente erezione in termini di durata e turgidità del membro, il paziente inoltre lamenta un calo del desiderio sessuale. Il problema è di media-elevata entità.

Il trattamento preventivo per ridurre od eliminare tale deficit prestazionale prevede:

- 1) L'assunzione di una (1) bustina al giorno di Andros Sanedia, sciolta in un bicchiere d'acqua e preferibilmente assunta al mattino dopo colazione.
- 2) Ad integrazione del trattamento si deve anche assumere una (1) compressa al giorno di Oxiton Sanedia preferibilmente alla sera subito dopo cena.
- 3) Gli effetti del trattamento iniziano ad essere riscontrabili in maniera significativi dopo 10-15 gg di trattamento e raggiungono il loro effetto massimo nell'arco di 2-3 mesi. In casi di entità elevata il medico può aumentare la dose di Andros a due (2) bustine al giorno (una al

mattino dopo colazione ed una dopo pranzo) per i primi 20 giorni di trattamento e poi tornare alla dose di una (1) bustina al giorno.

Prescrizione: per il trattamento è necessario prescrivere:

- 1) 1 confezione di Andros Sanedia da 20 bustine sufficiente a 20 gg di trattamento
- 2) 1 confezione di Oxiton Sanedia (se necessaria) da 30 compresse sufficiente a 30 gg di trattamento.

Andros di Sanedia grazie al contenuto di Citrulina, Arginina e Tribulus migliora durata e qualità dell'erezione, il cacao e la maca hanno effetti afrodisiaci e di aumento del desiderio ed unitamente alla carnitina e al co-enzima Q10 aumentano tono ed energia. Il Tribulus ha anche effetti positivi per quanto riguarda l'aumento della produzione di spermatozoi.

Oxiton di Sanedia grazie all'alto contenuto di acido alfa-lipoico, co-enzima Q10, ginko, Rodhiola ed Eleuterococco ha proprietà anti-ossidanti, energizzanti e di stimolo del microcircolo.

Note mediche:

Il Protocollo Terapeutico proposto ha dimostrato la sua efficacia, nella pratica ambulatoriale, per il trattamento di pazienti soggetti a deficit erettile e calo del desiderio di lieve, media e elevata entità.

Avvertenza: il Protocollo Terapeutico illustrato nel presente documento deve essere somministrato esclusivamente sotto controllo medico e previa verifica della sua compatibilità con la situazione clinica del paziente.